



# Approach® Prima

## FUNGICIDA

### Precauciones y advertencias:

- MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS.
- NO LO TRANSPORTE NI ALMACENE CON ALIMENTOS.
- INUTILICE Y ELIMINE ADECUADAMENTE LOS ENVASES VACÍOS.
- EN CASO DE INTOXICACIÓN LLEVE LA ETIQUETA, EL FOLLETO O ENVASE AL MÉDICO.
- NO LAVE LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RÍOS Y DEMÁS FUENTES DE AGUA.
- NO APLIQUE EL PRODUCTO EN LA PRESENCIA DE VIENTOS FUERTES O EN HORAS DE MUCHO CALOR.

Número de lote o partida: (ver envase)

Fecha de fabricación y vencimiento: (ver envase)

Contenido neto: **5 litros**

NO INFLAMABLE.

® Marca registrada de Corteva Agriscience y sus compañías afiliadas.

FUNGICIDA SISTEMICO

Grupo Químico: Estrobilurina + Triazol

**SUSPENSIÓN CONCENTRADA**

Fungicida sistémico, de acción preventiva, curativa y residual

### COMPOSICIÓN

picoxistrobina: metil (E)-2-[2-(6-trifluorometilpiridin-2-yloxy metil)-fenil] 3-metoxiacrilato .....	20% (p/v)
ciproconazol: 2-(4-clorofenil)-3-ciclopropil-1-(1H-1,2,4-triazol-1-il) butano-2-ol .....	8% (p/v)
inertes y coadyuvantes c.s.p. ....	100%

### LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA Y EL FOLLETO ADJUNTO ANTES DE USAR EL PRODUCTO.

Registro de Corteva Agriscience Paraguay S.A. N° A.4-SENAVE: 57,  
A.7-SENAVE: 57, N° Registro SENAVE: 3892, N° Libre Venta SENAVE: 3862

**Registrante:** Corteva Agriscience Paraguay S.A.  
López Moreira casi Aviadores del Chaco - Edificio Royal Tower, piso 4 -  
Asunción, República del Paraguay - Tel: (021) 613-412 / 608-583

**Fabricante:** Rizobacter Argentina S. A.  
Avda. Dr. Arturo Frondizi 1.150 - Calle N° 1  
Parque Industrial Pergamino - CP: B2702HDA - Buenos Aires, Argentina

**Importado y distribuido por:** Corteva Agriscience Paraguay S.A.  
López Moreira casi Aviadores del Chaco - Edificio Royal Tower, piso 4 -  
Asunción, República del Paraguay - Tel: (021) 613-412 / 608-583

A60003014 2107



## CUIDADO



**Precauciones:** • MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS. • NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS. • INUTILIZAR LOS ENVASES VACÍOS PARA EVITAR OTROS USOS. • EN CASO DE INTOXICACION LLEVAR ESTA ETIQUETA AL MEDICO. • NO LAVE LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RÍOS Y DEMÁS FUENTES DE AGUA. • NO APLIQUE EL PRODUCTO EN PRESENCIA DE VIENTOS FUERTES O EN HORAS DE MUCHO CALOR.

**Medidas precautorias generales:** • Evitar el contacto con la piel, ojos y las ropas. • Evitar respirar la neblina de la pulverización o inhalar el producto. • No destapar los picos del aplicador con la boca. • Al terminar el trabajo, lavar con agua y jabón las partes del cuerpo expuestas al contacto con el producto luego de su manipuleo, como así también la ropa utilizada. • No comer, beber ni fumar mientras se prepara o se aplica el producto, o en los lugares donde se lo almacena.

**Equipos de Protección Personal: Carga del equipo pulverizador y aplicación del producto:** Debe utilizarse el siguiente equipo: Protector facial y gorra con protección para la nuca, camisa de mangas largas y pantalones largos -o enterizo de Tyvek®, botas de goma y guantes con barreras laminadas o de goma de nitrilo o butilo. En aplicaciones prolongadas y sin la debida protección, el producto puede irritar la piel. Utilizar siempre los equipos de protección recomendados.

**Riesgos ambientales: Abejas:** Virtualmente no tóxico. **Aves:** Ligeramente tóxico. **Peces y Organismos acuáticos:** Muy tóxico (dejar 5 metros de franja de seguridad entre áreas tratadas y cuerpos o cursos de agua).

**Precauciones ambientales:** Deben extremarse los cuidados para evitar la contaminación directa de los cuerpos de agua ya sea durante la aplicación y uso del producto, o durante las operaciones de carga y limpieza del equipo, enjuague de envases vacíos, etc. Evitar la deriva de la pulverización (Ver "Manejo de la Deriva"). En todos los usos debe dejarse una franja sin aplicar (zona buffer) de al menos 5 metros sobre las riberas de cuerpos o cursos de agua.

**Manejo de la deriva:** Evitar la deriva de la neblina de pulverización. Las medidas básicas que minimizan este efecto son: no aplicar con vientos superiores a 8-10 km/h o menores a 3 km/h (por riesgo de inversión térmica), disminuir la altura de la barra de aplicación (mínima altura que permita lograr una pulverización homogénea, y pulverizar gotas de gran diámetro (aproximadamente 200 micras); esto último se logra empleando el mayor volumen y la menor presión recomendados.



**Tratamientos de remanentes:** El caldo remanente no se podrá reutilizar en otra oportunidad. Los sobrantes de caldo de pulverización que no se utilicen pueden ser pulverizados a dosis normales de uso en áreas no cultivadas, donde no accedan personas y lejos de fuentes de agua. Tratamiento y método de destrucción de envases vacíos:

Los envases vacíos deben descontaminarse mediante triple enjuague. Para ello seguir los siguientes pasos:

1. Llenar los envases con agua hasta 1/3 de su capacidad y taponarlos firmemente.
2. Agitar enérgicamente los envases durante 30 segundos.
3. Verter el agua del enjuague en el tanque del aplicador.
4. Repetir dos veces más los pasos 1 al 3.

No contaminar fuentes de agua al eliminar el agua de limpieza de los equipos de pulverización; disponer sobre campo arado o camino de tierra. Los envases plásticos descontaminados deben inutilizarse perforándolos tratando de no dañar la etiqueta al efectuar esta operación. Estos envases pueden destinarse para reciclado del material. Las cajas de cartón del embalaje se pueden quemar a llama viva, a cielo abierto, o disponer junto a residuos comunes.

**Almacenamiento:** No almacenar a temperaturas extremas (evitar temperaturas bajo -10°C y sobre 35°C). Mantener el producto en sus envases originales bien cerrados, y alejado de fuentes de calor, llamas o chispas, y al resguardo de la luz solar. Mantener alejado de alimentos, otros plaguicidas, semillas, forrajes y fertilizantes. Almacenar en locales cerrados secos y ventilados, con piso impermeable; la construcción debe ser de material no combustible; de ser factible estos sitios deben estar provistos de sistemas automáticos de detección y extinción de incendios. No comer, beber ni fumar en estos lugares.

**Derrames: Producto sin preparar o caldo de pulverización:** Mantener alejados a personas y animales. No fumar. Contener y absorber el derrame con un material inerte (arena, tierra) y recogerlo con pala conjuntamente con la capa superficial de suelo afectado. En ambos casos colocar el material recogido en tambores rotulados y cubrirlo totalmente con una solución al 1% de agua amoniacal (1 litro cada 100 litros de agua). Disponer preferentemente mediante incineración controlada o enterrar en un sitio no anegable preparado para tal fin (paredes y fondo recubiertos de cal) donde no haya posibilidades de contaminar cursos o napas de agua.

**PRIMEROS AUXILIOS**

EN CUALQUIER CASO CONSEGUIR AYUDA MEDICA

**Ingestión:** Administrar repetidamente carbón medicinal con abundante cantidad de agua. No administrar nada por vía oral a una persona inconsciente, ni tampoco inducir el vómito. **Contacto con la piel:** Quitar toda la ropa y calzado contaminados. Lavar con abundante agua y jabón las partes del cuerpo que hubieran tomado contacto con el producto. Si la piel está irritada dar atención médica. **Contacto con los ojos:** Mantener manualmente los párpados abiertos y lavar los ojos bajo un chorro suave de agua en forma constante durante por lo menos 15 minutos. **Inhalación:** Retirar el accidentado al aire fresco, protegiéndolo de la hipotermia. Dar atención médica inmediata en caso de actividad respiratoria anormal.

**Advertencia para el médico**

**Toxicidad: Clase III (PRODUCTO POCO PELIGROSO)**

**Tratamiento: No existe antídoto específico. Aplicar tratamiento Sintomático.**

**Síntomas de intoxicación aguda**

No se conocen síntomas específicos de intoxicación aguda. **Approach® Prima** es un producto "poco peligroso", por la vía oral y "normalmente no ofrece peligro" por las vías dermal e inhalatoria. Es "leve irritante" dermal. No es irritante ocular ni sensibilizante alérgico. En aplicaciones prolongadas y sin la debida protección puede irritar la piel. Durante la preparación y aplicación utilizar siempre los elementos de protección indicados en esta etiqueta.

**Consultas en caso de intoxicaciones**

(021) 220-418 Centro Toxicológico Nacional  
 (021)204800 Emergencias Médicas, Gral. Santos c/M. Domínguez  
 (021) 292164 Lacimet: Avda. Venezuela y Tte. Escurra, Asunción y/o a los teléfonos de la distribuidora del plaguicida.



# Approach® Prima

## FUNGICIDA

**Precauciones y advertencias:**

- MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS.
- NO LO TRANSPORTE NI ALMACENE CON ALIMENTOS.
- INUTILICE Y ELIMINE ADECUADAMENTE LOS ENVASES VACÍOS.
- EN CASO DE INTOXICACIÓN LLEVE LA ETIQUETA, EL FOLLETO O ENVASE AL MÉDICO.
- NO LAVE LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RÍOS Y DEMÁS FUENTES DE AGUA.
- NO APLIQUE EL PRODUCTO EN LA PRESENCIA DE VIENTOS FUERTES O EN HORAS DE MUCHO CALOR.

Número de lote o partida: (ver envase)

Fecha de fabricación y vencimiento: (ver envase)

Contenido neto: **5 litros**

NO INFLAMABLE.

® Marca registrada de Corteva Agriscience y sus compañías afiliadas.



# CUIDADO



FUNGICIDA SISTEMICO  
 Grupo Químico: Estrobilurina + Triazol  
**SUSPENSIÓN CONCENTRADA**  
 Fungicida sistémico, de acción preventiva, curativa y residual

COMPOSICIÓN	
picoxistrobina: metil (E)-2-[2-(6-trifluorometilpiridin-2-yloxy)metil-fenil] 3-metoxiacrilato .....	20% (p/v)
ciproconazol: 2-(4-clorofenil)-3-ciclopropil-1-(1H-1,2,4-triazol-1-il)butano-2-ol .....	8% (p/v)
inertes y coadyuvantes c.s.p. ....	100%

**LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA Y EL FOLLETO ADJUNTO ANTES DE USAR EL PRODUCTO.**

Registro de Corteva Agriscience Paraguay S.A. N° A.4-SENAVE: 57, A.7-SENAVE: 57, N° Registro SENAVE: 3892, N° Libre Venta SENAVE: 3862

**Registrante:** Corteva Agriscience Paraguay S.A. López Moreira casi Aviadores del Chaco - Edificio Royal Tower, piso 4 - Asunción, República del Paraguay - Tel: (021) 613-412 / 608-583

**Fabricante:** Rizobacter Argentina S.A. Avda. Dr. Arturo Frondizi 1.150 - Calle N° 1 Parque Industrial Pergamino - CP: B2702HDA - Buenos Aires, Argentina

**Importado y distribuido por:** Corteva Agriscience Paraguay S.A. López Moreira casi Aviadores del Chaco - Edificio Royal Tower, piso 4 - Asunción, República del Paraguay - Tel: (021) 613-412 / 608-583

A60003014 2107

## FOLLETO DORSO

**GENERALIDADES:** **Aproach® Prima** es un fungicida de uso agrícola con propiedades sistémicas, acción preventiva, y curativa post infectiva (en las primeras fases luego de la infección) y efecto residual, para el control de hongos de las clases de los ascomicetes, basidiomycetes y deuteromicetes. **Aproach® Prima** combina la acción de dos principios activos, picoxystrobin y ciproconazole, los cuales en conjunto poseen acción preventiva, porque inhibe la germinación de esporas, y efecto curativo porque inhibe el crecimiento micelial de los hongos patógenos. **Aproach® Prima** actúa como un inhibidor de la respiración mitocondrial de las células de los hongos, interfiriendo en el ciclo de vida de los mismos, principalmente en los procesos de germinación de las esporas, infección y crecimiento de las hifas.

Además, interrumpe la biosíntesis del ergosterol, el cual es un componente esencial de la pared celular de los hongos. **Aproach® Prima** es transportado en forma transaminar y acropétala dentro de las hojas y posee movimiento sistémico vía xilema.

### INSTRUCCIONES PARA EL USO

#### PREPARACIÓN

AGITAR EL PRODUCTO ANTES DE USAR

**Aproach® Prima** está formulado como una suspensión concentrada. Para su preparación se aconseja seguir los siguientes pasos:

1. Verificar que el equipo esté perfectamente limpio.
2. Cargar el tanque de la pulverizadora con agua limpia y filtrada, hasta la mitad de su capacidad y poner el agitador en marcha.
3. Agregar el volumen necesario de **Aproach® Prima** según superficie a tratar y dosis a aplicar; incorporar el producto lentamente al tanque del equipo, sin disolución previa, evitando salpicaduras. Cuando se realicen mezclas de tanque, los *polvos mojables* y *granulados dispersables deben agregarse al tanque antes* que **Aproach® Prima**; productos con *otras formulaciones deben agregarse luego* de **Aproach® Prima** y solo después que éste se haya suspendido completamente. Para una mayor consistencia del tratamiento puede agregarse un coadyuvante (aceite mineral parafínico 42,8% a una dosis de 500 ml/100 L de caldo).
4. Completar la carga de agua del tanque y agitar mediante el retorno de la bomba hasta lograr una suspensión homogénea. Preparar únicamente lo estimado para aplicar en el día. No es conveniente dejar producto preparado de un día para el otro.

**EQUIPOS, VOLÚMENES Y TÉCNICAS DE APLICACIÓN:** **Aproach® Prima** debe aplicarse al cultivo con el volumen necesario para lograr una buena cobertura. Se recomienda utilizar la cantidad de agua necesaria de acuerdo al estado de desarrollo del cultivo, a fin de lograr una excelente cobertura del mismo; evitar que se produzca escurrimiento del mismo por exceso de agua. **Aproach® Prima** puede ser aplicado con equipos terrestres o aéreos:

- **En aplicaciones terrestres** se deben utilizar caudales no inferiores a 200 litros de agua por hectárea, trabajando con una presión de 50-80 libras/pulgada<sup>2</sup> (5,5 - 7 bar) para lograr una buena penetración del producto y mojado del cultivo. Es recomendable una aplicación que logre una distribución uniforme de gotas en la superficie foliar y cuyo tamaño sea lo más homogéneo posible. Los picos más aptos para tal fin son los de cono hueco y doble abanico plano, que producen gotas de entre 100 y 250 micrones. Se deben lograr entre 40 y 60 impactos/cm<sup>2</sup> de la superficie foliar. Antes de aplicar es necesaria la calibración del equipo con agua, a velocidad y presión constantes, en un terreno de iguales características al sitio de aplicación.

- **Con equipos aéreos** se debe utilizar un caudal no menor de 30-40 L/ha, calibrando el equipo para asperjar entre 30-40 gotas/cm<sup>2</sup>. *No aplicar utilizando gas oil*. No exceder nunca el ancho efectivo de trabajo de la aeronave. Suspender las aplicaciones con vientos superiores a los 10 km/h.

**ADVERTENCIAS:** **Aproach® Prima** es un fungicida exclusivamente para uso agrícola. No utilizar en cultivos ornamentales, hidropónicos o cualquier otro uso distinto de lo específicamente indicado en esta etiqueta. **Aproach® Prima** no debe aplicarse en cultivos sometidos a estrés producto de sequías, bajas temperaturas, ataque de insectos, deficiencias minerales, etc. **Aproach® Prima** no debe aplicarse si se prevén lluvias dentro de las tres horas luego de la aplicación.

**RECOMENDACIONES DE USO:** Las cualidades preventivas y el efecto curativo de **Aproach® Prima** dan plasticidad para permitir el control de los patógenos durante todo su ciclo de desarrollo. Se recomienda que la aplicación de **Aproach® Prima** se realice a la aparición de los primeros síntomas de enfermedad para evitar que el progreso del patógeno impacte sobre el rendimiento.

CULTIVO	ENFERMEDADES	DOSIS	MOMENTO DE APLICACIÓN
TRIGO	Mancha de la hoja ( <i>Septoria tritici</i> ) Roya anaranjada ( <i>Puccinia recondita</i> ) Mancha amarilla ( <i>Drechslera tritici repentis</i> )	+ Aceite mineral parafínico 42.8% (500 a 750 cm <sup>3</sup> /ha) 300 a 400 cm <sup>3</sup> /ha	El desarrollo de enfermedades normalmente ocurre desde principio de encañazón hasta hoja bandera completamente desplegada (última hoja que se despliega). Aplicar durante este período cuando aparezcan los primeros síntomas ó tan pronto como las condiciones climáticas sean favorables para el desarrollo de enfermedades. Dentro del período señalado es muy importante proteger la hoja bandera y la inmediata inferior, dada la importancia de las mismas en el llenado de granos y definición del rendimiento.
SOJA	Complejo de enfermedades de fin de ciclo: Tizón de la hoja y mancha púrpura de la semilla ( <i>Cercospora kikuchii</i> ); Mancha marrón o Septorios ( <i>Septoria glycines</i> ); Mildiu ( <i>Peronospora manshurica</i> )	300 cm <sup>3</sup> /ha + Aceite mineral parafínico 42.8% (500 cm <sup>3</sup> /ha)	A partir de R3 hasta R5.5 cuando se observen los primeros síntomas en la planta.
	Roya de la soja (Phakopsora pachyrhizi)	300 cm <sup>3</sup> /ha + Aceite mineral parafínico 42.8% (500 cm <sup>3</sup> /ha)	Aplicar al observar los primeros síntomas (con el cultivo en el estado de R3 a R5). En caso de persistir condiciones favorables y aparecer nuevas pústulas, realizar una segunda aplicación.
MAÍZ	Cercosporiosis (Cercospora zaeae-maydis)	500 a 600 cm <sup>3</sup> /ha + Aceite mineral parafínico 42.8% (500 a 750 cm <sup>3</sup> /ha)	<b>Efectuar al máximo dos aplicaciones por ciclo de cultivo.</b> Para el control de Cercosporiosis, realizar la 1ª aplicación de forma preventiva durante la fase de 7 a 8 hojas, reaplicando en intervalos de 14 a 21 días de acuerdo con el desarrollo del cultivo y precocidad del cultivar utilizado. Optar por la mayor dosis cuando sea necesario un mayor periodo de control y alta presión de la enfermedad.
	Mancha de Phaeosphaeria (Phaeosphaeria maydis)	500 a 600 cm <sup>3</sup> /ha + Aceite mineral parafínico 42.8% (500 a 750 cm <sup>3</sup> /ha)	<b>Efectuar al máximo dos aplicaciones por ciclo de cultivo.</b> Para el control de la mancha de Phaeosphaeria, realizar la 1ª aplicación de forma preventiva, reaplicando en intervalos máximo de 21 días.
	Roya Común (Puccinia sorghi)	500 a 600 cm <sup>3</sup> /ha + Aceite mineral parafínico 42.8% (500 a 750 cm <sup>3</sup> /ha)	<b>Efectuar al máximo dos aplicaciones por ciclo de cultivo.</b> Para el control de roya común, realizar la 1ª aplicación de forma preventiva, reaplicando en intervalos máximo de 14 días.

**Restricciones de uso:** Se deben respetar los siguientes intervalos entre la última aplicación y la cosecha: Soja: 30 días; Trigo: 35 días; Maíz: 42 días. En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberán conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia.

**Rotación de cultivos:** No presenta restricciones de rotación.

**Compatibilidad:** Es compatible con la mayoría de los compuestos fitosanitarios excepto los de reacción alcalina como el caldo bordelés y polisulfuro de calcio. No aplicar en mezcla con ningún producto sin realizar previamente una prueba en pequeña escala, de compatibilidad física y biológica de los componentes, y de fitotoxicidad para el cultivo.

**Fitotoxicidad:** No es fitotóxico para los cultivos recomendados y en las condiciones de uso detalladas en esta etiqueta.

#### "Consulte con un Ingeniero Agrónomo"

**Limpieza de los equipos pulverizadores** - Para la limpieza del equipo seguir los siguientes pasos:

1. Drenar el tanque, mangueras y barras.
2. Agregar agua al tanque (aproximadamente un cuarto de su capacidad) y detergente de uso doméstico (50-100 cm<sup>3</sup> cada 100 litros de agua). Hacer recircular esta solución por un periodo mínimo de 10-15 minutos. Remover físicamente todo depósito formado.
3. Drenar y enjuagar con agua limpia.
4. Desarmar los picos y lavar aparte los casquillos, filtros y pastillas; enjuagar con agua limpia.
5. Lavar exteriormente el equipo con agua y detergente y enjuagar con agua limpia. Las aguas contaminadas provenientes del proceso de limpieza, pueden ser dispuestas pulverizándolas en áreas no cultivadas, donde no accedan personas y lejos de fuentes de agua. No contaminar pozos o fuentes de agua durante el proceso de limpieza de los equipos.

**Manejo de Resistencia:** Cuando se utilizan repetidamente fungicidas de un mismo modo de acción para controlar las mismas enfermedades en la misma zona, puede ocurrir la aparición de razas o patotipos resistentes que pueden sobrevivir, propagarse y volverse dominantes. Prácticas tales como el uso alternado o la mezcla de fungicidas de distinto modo de acción, o el uso de fungicidas que combinan ingredientes activos con distinto modo de acción, evitan o demoran la proliferación de tales patotipos.

**Máximo número de tratamientos por ciclo:** Trigo, Soja y Maíz: 2 aplicaciones.



## CUIDADO

